

速利清 注射液

CEREBROLYSIN Ampoules

衛署藥輸字第018737號

速利清注射液是經由管制的水解作用 controlled hydrolysis 自腦蛋白中取得，這種水溶液含有多種氨基酸——呈現於「氨基酸的原型」內之氨基酸，其相互定量的關係，以及由於水解作用的平衡發展，促成這些氨基酸和低分子縮氨酸的結合（就像其他化學反應一樣），由於這些少量縮氨酸類和多量縮氨酸類沒有蛋白質的特性，因此不會有過敏的反應。

【成分】
 Each ml contains: Cerebrolysin Concentrate 215.2mg

Alanine. 3.00mg	Methionine. 0.50mg
Arginine 0.25mg	Phenylalanine. 2.00mg
Aspartic Acid 3.00mg	Proline. 1.60mg
Cystine. 0.01mg	Serine 0.30mg
Glutamic Acid. 4.50mg	Threonine. 0.30mg
Glycine. 1.50mg	Tryptophan. 0.50mg
Histidine. 1.30mg	Tyrosine. 0.24mg
Isoleucine. 2.00mg	Valine 2.00mg
Leucine 6.00mg	sodium Hydroxide 4N q.s. (pH 7.1)
Lysine 5.80mg	Water for injection q.s.

【適應症】
 不能攝取適當食物之患者之補助治療劑，蛋白質之消化吸收機能及合成利用障礙，嚴重創傷、火傷，骨折時蛋白質之補給，蛋白質攝取減少，營養失調症。


【用法用量】
 治療初期每天2公撮的速利清做肌肉或靜脈的注射，然後治療間隔加長至兩或三天。
 較輕的症狀每一治療過程需10~15針，較重的症狀則視需要可加長至數個治療過程。
 高劑量使用5公撮或10公撮安瓿裝：
 每天5-40公撮緩慢的靜脈注射或點滴注射。根據病況每一治療過程10至15針，如需要可連續數個治療過程。
 本藥限由醫師使用。

【副作用】
 注射速度太快時，會有輕微灼熱感，極少有惡寒或體溫上升之過敏反應。

【禁忌】
 嚴重腎功能不全者。

【包裝】
 2公撮：每盒10、50等安瓿裝。
 5公撮：每盒1、5、10、30、50等安瓿裝。
 10公撮：每盒1、5、50等安瓿裝。
 20公撮：每盒1、5等安瓿裝。

許可證持有者：
EVER Neuro Pharma GmbH
 Mondseetraße 11, AT-4866 Unterach AM ATTERSEE, Austria
製造廠：
EVER Pharma Jena GmbH
 Otto-Schott-Strasse 15, 07745 Jena, Germany
藥商：
 美吾華股份有限公司
 台北市復興北路167號5樓 電話：(02)2713-1569




75 mm

827
Laetus-Code
reading direction

827
Laetus-Code
reading direction

75 mm

	<h3>Layout Management</h3>	Editor: Marko Rosa Version: xx.xx.xxxx
Material description: Cerebrolysin Kunde/customer: EVER Neuro Pharma GmbH Material: leaflet PAGE 1/2 Dimensions / Size: 148 x 297 mm Material No. Customer:	Aufmachung/country: TW Material Quality: 40 g/qm Laetus Pharmacode: 827 Material No. EVJ: 46080989	
color separation: PMS 533 specifications: remarks info		
genehmigt/approved:	Datum/date:	